


DE VRUCHTEN VAN DE ZEE



Verspreiding tongschar (Aquamapas.org)

Via deze rubriek helpen we je in je zoektocht naar objectieve informatie over duurzame visserij en visconsumptie, en over andere eetbare kust- en zeeproducten.

TONGSCHAR, ONBEKEND MAAR LEKKER

Tong, schar, scharretong en tongschar ... Het zijn allen platvissen, maar de gelijkende Nederlandse namen zorgen bij heel wat consumenten voor verwarring*. Echte kenners waarderen tongschar vanwege een smaak die sterk aan tong doet denken. De filets zijn even wit, hoewel ze wat dikker uitvallen en het vlees wat zachter is. Maar vooral de prijs van tongschar is zachter dan die van tong. Maar hoe duurzaam is tongschar eigenlijk?

Is het een tong? Is het een schar?

Tongschar (*Microstomus kitt*) is een platvis uit de familie van de schollen, verwant aan schol, schar, bot en heilbot. De tong behoort dan weer tot de familie van de tongen. Je herkent deze laatste twee families gemakkelijk omdat hun ogen op hun gekleurde "rechterkant" zitten. Bij platvissen zoals tarbot, griet en scharretong (van de tarbottenfamilie) vind je de ogen op de linkerkant (zie foto's).

Tongschar heeft helaas geen sterk uitgesproken kenmerken. Dat maakt het moeilijk om hem tussen andere soorten van de scholfamilie te spotten. Let vooral op de combinatie van een gladde, warmbruine en fijn gemarmerde 'rechterzijde', een kleine kop en mond, en een rechte zijlijn. Bij levende en heel vers gevangen exemplaren is de ovale geel-oranje vlek net achter de borstvin kenmerkend, maar die verdwijnt nogal snel. Ook schol heeft een gladde huid en een rechte zijlijn, maar vertoont (meestal) oranje vlekken. Schar heeft dan weer een ruwe huid en een sterk gebogen zijlijn boven de borstvin.

Belang van de tongschar voor de Belgische visserij

Tongschar komt voor van de Barentssee tot het noorden van de Golf van Biskaje. Talrijkst is ze in de Noordzee en op



■ Tongschar (boven links) is niet zo heel gemakkelijk te onderscheiden van andere populaire leden van de scholfamilie, zoals schol (boven midden), schar (boven rechts), witje (midden links) en bot (midden midden). Net als tong (midden rechts) hebben ze hun ogen op de rechterkant staan, in tegenstelling tot de leden van de tarbotfamilie: scharretong (onder links), griet (onder midden) en tarbot (onder rechts) (VLAM)

visgronden rond de Britse Eilanden. Ze leeft op harde ondergronden, waar ze zich voedt met wormen en ander bodemgrut.

Hoewel tongschar voor Belgische vissers een bijvangstsoort is in de visserij op tong en schol, bedraagt de jaarlijkse aanvoer om en bij de 1000 ton. Zo bekleedt tongschar de zesde plaats van de meest aangevoerde vissoorten in de Vlaamse visveilingen. Slechts 2 procent van de Belgische gezinnen koopt de soort geregeld, goed voor amper een tiende van de aanvoer. De kleine vraag bij de consument en horeca leidt ertoe dat vissers een relatief lage prijs voor de lekkere tongschar krijgen in de vismijn (gemiddeld 5,70 EUR per kilo, versus voor tong tot 13 EUR).

Wordt tongschar duurzaam bevist?

Twee derde van de tongschar die onze vissers aanvoeren komt uit de Noordzee en het Oostelijk Engels kanaal. Op basis van jaarlijkse opvolging beoordeelt de wetenschap dit tongscharbestand als gezond. Het andere derde van de Belgische aanvoer komt uit de Keltische Zee. Hier wordt geen officiële wetenschappelijke bestandsevaluatie georganiseerd. Wel tonen voorlopige analyses dat ook rond de toestand van deze stock geen redenen tot ongerustheid bestaan.

Tongschar is voor de Belgische vissers geen doelsoort op zich, maar bijvangst bij het vissen op tong en schol met bodemsleepnetten (voornamelijk boomkor). Deze weinig selectieve techniek staat bekend om zijn hoge ongewenste ecosysteempact en bijvangsten. Andere, selectievere of minder bodem beroerende vistechieken worden door Belgische vissers niet gebruikt bij het vissen op tongschar en/of op de doelsoorten tong en schol. Anderzijds is voor tongschar kiezen, wel kiezen voor 'lokaal' en 'Belgisch' (want de soort wordt niet van elders geïmporteerd op de Belgische markt).

Tongschar plant zich voort vanaf een lengte van 20-30 cm. Verkoop mag pas vanaf 25 cm. Dus ook dat zit goed.

De Belgen vissen de meeste tongschar van eind augustus tot in het najaar, buiten de paaiperiode van de soort. Vanuit biologisch én culinair standpunt is dit de ideale periode om voor een tongschar te kiezen. Nog even wachten tot volgende zomer, dus!

* We houden het hier op de officiële handelsbenamingen en laten de dialectbenamingen voor tongschar het liefst achterwege om de verwarring niet nog groter te maken (melktong, hotelong, steenschar, steenschol, nesttong, tongschol of op zijn West-Vlaams ook 'steenschulle', 'scheve mulle', 'scheve toote' ...).

NF

met dank aan: Kelle Moreau, Els Torreele, Hans Polet en Heleen Lenoir (ILVO)

Lees meer

<http://pers.vlam.be/nl/pers/detail/5174/vis-van-het-jaar-2016-tongschar>